

RAPPORTO UNICEF 'La condizione dei bambini in Africa 2008'

DATI E CIFRE

Quadro generale

- Nel 2006, 5 milioni di bambini sono morti nel continente africano prima di raggiungere il 5° anno di vita: una media di quasi 14.000 al giorno.
- L'Africa sub-sahariana ha ridotto il proprio tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni di poco più di 1/3 durante i 36 anni che vanno dal 1970 al 2006. E' necessario un tasso annuale di riduzione d'oltre il 10% per i prossimi 8 anni per far sì che la regione raggiunga il 4° *Obiettivo di sviluppo del millennio* relativo alla sopravvivenza infantile.
- Dei 10 più alti tassi al mondo di mortalità infantile sotto i 5 anni 9 si registrano in paesi dell'Africa sub-sahariana. Nel 2006, la Sierra Leone deteneva il più alto tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni, con 270 decessi ogni 1.000 nati vivi, seguita dall'Angola, dove il tasso di mortalità infantile sotto i 5 anni risultava lo stesso del 1990 (260 decessi ogni 1.000 nati vivi).
- In soli 3 paesi – Repubblica Democratica del Congo, Etiopia e Nigeria – si registra il 43% di tutti i decessi sotto i 5 anni dell'intera Africa.
- Circa il 45% della popolazione dell'Africa sub-sahariana non utilizza fonti sicure d'acqua potabile. Di questi, 54 milioni sono bambini con meno di 5 anni. Oltre il 60% rimane senza accesso a servizi igienico-sanitari adeguati.

Aree di progresso

- Dal 1990, 5 paesi del nord Africa - Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia – hanno ridotto i rispettivi tassi di mortalità infantile di almeno il 45%, mettendosi sulla giusta rotta per conseguire l'*Obiettivo di sviluppo del millennio* relativo alla sopravvivenza infantile.
- Dal 1990, la mortalità infantile sotto i 5 anni è scesa del 40% ed oltre in Eritrea, Etiopia, Malawi e Mozambico.
- Le morti da morbillo in Africa sono diminuite d'oltre il 90% tra il 2000 e il 2006.
- Dal 2000, l'utilizzo di zanzariere trattate per la protezione dalla malaria è triplicato in 16 paesi africani.
- Nell'Africa orientale e meridionale, l'accesso ai trattamenti antiretrovirali contro l'HIV è aumentato, per i minori di 15 anni, dal 12% del 2005 al 17% nel 2006.
- Nell'Africa sub-sahariana, i tassi di allattamento esclusivo al seno durante i primi 6 mesi di vita del bambino sono aumentati dal 22% del 1996 a circa il 30% del 2006: nello stesso periodo di tempo, Benin, Ghana, Madagascar e Malawi hanno aumentato di oltre il 50% i propri tassi di allattamento esclusivo al seno.